

การศึกษาอัตราการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับ

การตรวจสไปโรเมทรีในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

The Study of Exacerbation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients

received investigation by spirometry in Si SaKet Hospital

โดย

นางสาวอังคณา บุญลพ

นางสาววีรจิมา ไชยยศ

นางสาวดวงเดือน ทองผิว

หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม3 (MICU3)

โรงพยาบาลศรีสะเกษ พ.ศ. 2560

การศึกษาการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการตรวจ
สไปโรเมตรีในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

(The Study of Exacerbation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients
received investigation by spirometry in Si SaKet Hospital)

อังคณา บุญลพ พย.ม.*

วีรธิดา ไชยยศ พย.บ.**

ดวงเดือน ทองผิว พย.บ.***

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้ารับการรักษาที่ห้อง
ฉุกเฉินและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประชากรเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการตรวจสไปโรเมตรี ปี พ.ศ.2559 ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 67 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงบรรยาย

ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 88.06 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.79 มีระดับความรุนแรงของโรคระดับ 2 และระดับ 1 ร้อยละ 44.77
และ 28.36 ตามลำดับ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของโรคอยู่
ในระดับ 2 ร้อยละ 53.16 และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีระดับความรุนแรงของโรค
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 48.57

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือในการหาปัจจัยที่มีผลต่อการกำเริบ
ของโรคของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และเพื่อสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อไป

คำสำคัญ: การกำเริบเฉียบพลัน, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, สไปโรเมตรี

* พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

** พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

*** พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ